

Total number of printed pages-24

3 (Sem-4/CBCS) MAT HG/RC

2024

MATHEMATICS

(Honours Generic/Regular)

Answer the Questions from any one Option.

OPTION - A

(Real Analysis)

Paper : MAT-RC-4016/MAT-HG-4016

Full Marks : 80

Time : Three hours

OPTION - B

(Numerical Analysis)

Paper : MAT-HG-4026

Full Marks : 80

Time : Three hours

**The figures in the margin indicate
full marks for the questions.**

Answer either in English or in Assamese.

Contd.

OPTION - A

(Real Analysis)

Paper : MAT-RC-4016/MAT-HG-4016

1. Answer the following questions : $1 \times 10 = 10$

ভলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) If $a \neq 0$ and b in $\mathbb{R}$ are such that $a, b = 1$, then $b = \underline{\hspace{2cm}}$.

(Fill in the blank)

যদি $a \neq 0$ আৰু $b \in \mathbb{R}$ ত থাকে য'ত $a, b = 1$ হয়, তেন্তে $b = \underline{\hspace{2cm}}$ । (খালী ঠাই পূৰ কৰা)

(b) State triangle inequality.

ত্ৰিভুজ অসমতা উল্লেখ কৰা।

(c) If $S = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$. Find $\sup S$.

যদি $S = \left\{1 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N}\right\}$ হয়, তেন্তে S ৰ লঘিষ্ঠ উপৰীমা কিমান?

(d) When is a set called bounded ?
এটা সংহতিক কেতিয়া বদ্ধ বোলে?

(e) The sequence $((-1)^n)$ is a Cauchy sequence. (True or False)

$((-1)^n)$ অনুক্ৰমটো কণ্ঠি হয়। (সঁচা নে মিছা)

(f) Write down the range of the sequence $(0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots)$

$(0, 2, 0, 2, 0, 2, \dots)$ অনুক্ৰমটোৰ সীমা লিখ।

(g) State the completeness property of $\mathbb{R}$.

$\mathbb{R}$ ৰ সম্পূৰ্ণতা ধৰ্মটো লিখ।

(h) Define monotone increasing sequence.

ক্ৰমবৰ্ধমান অনুক্ৰমৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(i) If the series $\sum x_n$ converges, find $\lim(x_n)$.

যদি $\sum x_n$ শ্ৰেণীটো অভিসৰী হয়, তেন্তে $\lim(x_n)$ ৰ মান কিমান?

(j) When is a series said to be conditionally convergent ?

কেতিয়া এটা অসীম শ্ৰেণীক চৰ্তসাপেক্ষে অভিসৰী বুলি কোৱা হয়?

2. Answer the following : (any five) $2 \times 5 = 10$

তলৰ প্রশ্নসমূহৰ উত্তৰ দিয়া : (যিকোনো পাঁচটি)

(a) Define closed set and give one example.

বন্ধ সংহতিৰ সংজ্ঞা লিখা আৰু এটা উদাহৰণ দিয়া।

(b) Show that $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} \right) = 0$

দেখুওৱা যে $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{n^2 + 1} \right) = 0$

(c) Let a, b, c be any elements of $\mathbb{R}$. Then show that

(i) If $a > b$ and $c > 0$, then $ca > cb$.

(ii) If $a > b$ and $c < 0$, then $ca < cb$.

ধৰা হ'ল $a, b, c \in \mathbb{R}$ ৰ যিকোনো তিনিটা মৌল। তেন্তে দেখুওৱা যে

(i) যদি $a > b$ আৰু $c > 0$, তেন্তে $ca > cb$ ।

(ii) যদি $a > b$ আৰু $c < 0$, তেন্তে $ca < cb$ ।

(d) $S = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$, show that $\sup S = 1$ and $\inf S \geq 0$.

$S = \left\{ \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N} \right\}$, দেখুওৱা যে $\sup S = 1$ আৰু $\inf S \geq 0$.

(e) Show that the sequence $(1 + (-1)^n)$ is not a Cauchy sequence.

দেখুওৱা যে $(1 + (-1)^n)$ অনুক্রমটো কল্চি নহয়।

(f) Show that $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ diverges.

দেখুওৱা যে $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ শ্ৰেণীটো অপসৰ্গী।

3. Answer any four :

$5 \times 4 = 20$

যিকোনো চাৰিটিৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) If x and y are two real numbers with $x < y$, then prove that

(i) there exists a rational number r such that $x < r < y$

(ii) there exists an irrational number z such that $x < z < y$

$3 + 2 = 5$

যদি x আৰু y দুটা বাস্তব সংখ্যা হয় য'ত $x < y$,
তেতিয়া প্রমাণ কৰা যে .

(i) এনেকুৱা এটা পৰিমেয় সংখ্যা r থাকিব, যাতে
 $x < r < y$ হয়।

(ii) এনেকুৱা এটা অপৰিমেয় সংখ্যা z থাকিব, যাতে
 $x < z < y$ হয়।

(b) Define Cauchy sequence. Show that the
sequence $\left(1 + (-1)^n\right)$ is not a Cauchy
sequence.

কিঞ্চি অনুক্ৰমৰ সংজ্ঞা দিয়া। দেখুওৱা যে $\left(1 + (-1)^n\right)$

অনুক্ৰমটো কিঞ্চি নহয়।

(c) Test the convergence and absolute
convergence of

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 + 1} \quad 4 + 1 = 5$$

তলৰ শ্ৰেণীটোৰ অভিসাৰিতা আৰু নিৰংকুশ অভিসাৰিতা
পৰীক্ষা কৰা

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2 + 1}$$

(d) Prove that a sequence in $\mathbb{R}$ can have at
most one limit.

প্রমাণ কৰা যে $\mathbb{R}$ ৰ এটা অনুক্ৰমৰ অভ্যাসিক এটা সীমা
থাকে।

(e) Show that (দেখুওৱা যে)

$$(i) \quad ||x| - |y|| \leq |x - y|$$

$$(ii) \quad |x - y| \leq |x| + |y|, \quad x, y \in \mathbb{R}$$

(f) A function f defined in the set of real
numbers by

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{when } x \text{ is irrational} \\ -1, & \text{when } x \text{ is rational} \end{cases}$$

show that f is discontinuous at every
point.

এটা বাস্তৱ সংখ্যাৰ ফলন এনেদৰে সংজ্ঞাবদ্ধ

$$f(x) = \begin{cases} 1, & \text{যেতিয়া } x \text{ এটা অপৰিমেয় সংখ্যা} \\ -1, & \text{যেতিয়া } x \text{ এটা পৰিমেয় সংখ্যা} \end{cases}$$

দেখুওৱা যে f ফলনটো সকলো বাস্তৱ বিন্দুতে
অনবিচ্ছিন্ন।

4. Answer the following questions : 10×4=40

তলৰ প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ দিয়া :

(a) (i) Show that $\sqrt{2}$ is not a rational number.

দেখুওৱা যে $\sqrt{2}$ এটা পৰিস্ৰেয় সংখ্যা নহয়।

(ii) Write down all the algebraic properties of $\mathbb{R}$.

5+5=10

$\mathbb{R}$ ৰ সকলো বীজগণিতীয় ধৰ্মসমূহ লিখা।

Or / অথবা

(i) Define supremum of a nonempty subset S of $\mathbb{R}$.

Prove that an upper bound u of a nonempty set S in $\mathbb{R}$ is the supremum of S iff for every $\epsilon > 0$, $\exists$ an $s_\epsilon \in S$ such that $u - \epsilon < s_\epsilon$.

2+3=5

(ii) If $x > -1$, then prove that

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \forall n \in \mathbb{N} \quad 3$$

(iii) Determine the set

$$A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x > 2\} \quad 2$$

(i) $\mathbb{R}$ ৰ এটা অশূন্য উপসংহতি S ৰ বাবে লম্বিষ্ঠ

উচ্চ সীমাৰ সংজ্ঞা লিখা। প্ৰমাণ কৰা যে $\mathbb{R}$ ৰ এটা অশূন্য সংহতি S ৰ উচ্চ সীমা u টো S ৰ লম্বিষ্ঠ উচ্চ সীমা হ'ব যদি আৰু যদিহে প্ৰতিটো

$\epsilon > 0$ ৰ বাবে $s_\epsilon \in S$ থাকে য'ত

$$u - \epsilon < s_\epsilon$$

(ii) যদি $x > -1$ হয়, তেন্তে প্ৰমাণ কৰা যে

$$(1+x)^n \geq 1+nx \quad \forall n \in \mathbb{N}$$

(iii) $A = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 + x > 2\}$ সংহতিটো নিৰ্ণয় কৰা।

(b) State and prove Squeeze theorem. Show that the sequence (x_n) , where

$$x_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2}$$

converges to zero. 5+5=10

কুইজ উপপাদ্য লিখা আৰু প্ৰমাণ কৰা। দেখুওৱা যে

(x_n) অনুক্ৰমটো অভিসৰী, য'ত

$$x_n = \frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n+2)^2} + \dots + \frac{1}{(2n)^2}$$

Or / অথবা

Define monotone sequence. Prove that a monotone sequence of real numbers is convergent if and only if it is bounded.

একটি অনুক্রম সংজ্ঞা দিয়া। প্রমাণ কৰা যে বাস্তব সংখ্যাৰ এটা একাধিক অনুক্রম অনুসৰি হ'ব যদি আৰু যদিহে ই পৰিৱৰ্ত্তন হয়।

(c) Test the convergence of sequences (x_n)

and (y_n) as defined below and find the limit if exists for each. 5+5=10

তলত দিয়া ধৰণে সংজ্ঞাবদ্ধ অনুক্রম (x_n) আৰু

(y_n) ৰ অভিসাৰিতাৰ পৰীক্ষা কৰা আৰু স্থিতি হ'লে

অভিসাৰি বিন্দু নিৰ্ণয় কৰা।

(i) $x_n = \frac{3n+2}{n+1}$

(ii) $y_n = \sqrt{n+1} - \sqrt{n}$

Or / অথবা

Prove that a convergent sequence is bounded. Give a counter example to show that a bounded sequence may not be convergent. 8+2=10

প্রমাণ কৰা যে অভিসাৰি অনুক্রম এটা সদায় পৰিৱৰ্ত্তন হয়। এটা উদাহৰণৰ সহায়ত দেখুওৱা যে পৰিৱৰ্ত্তন অনুক্রম এটা অভিসাৰি নহ'বও পাৰে।

(d) Test the convergence of the following series :

5+5=10

তলৰ শ্ৰেণীসমূহৰ অভিসাৰিতা পৰীক্ষা কৰা :

(i) $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$

(ii) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)}$

Or / অথবা

Let $X = (x_n)$ and $Y = (y_n)$ be real sequences and suppose that for some $K \in \mathbb{N}$, $0 \leq x_n \leq y_n$ for $n \geq K$ then prove that

- (a) the convergence of $\sum y_n$ implies the convergence of $\sum x_n$.
- (b) the divergence of $\sum x_n$ implies the divergence of $\sum y_n$

ধরা $X = (x_n)$ আৰু $Y = (y_n)$ দুটা বাস্তব অনুক্রম আৰু ধৰা $K \in \mathbb{N}$, $0 \leq x_n \leq y_n$, য'ত $n \geq K$ তেন্তে প্রমাণ কৰা যে,

- (a) $\sum y_n$ অভিসাৰী হ'লে $\sum x_n$ অভিসাৰী হয়।
- (b) $\sum x_n$ অপসাৰী হ'লে $\sum y_n$ অপসাৰী হয়।

OPTION - B

(Numerical Analysis)

Paper : MAT-HG-4026.

1. Answer the following questions : $1 \times 10 = 10$

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

- (a) In Gauss Elimination method for solving system of equation $AX = B$, the matrix A is reduced to

Gauss Elimination পদ্ধতিত, $AX = B$ সমীকৰণ প্ৰণালী সমাধান কৰোঁতে মৌলকক্ষ A কোনটো ৰূপলৈ ৰূপান্তৰ হয়?

- (i) Upper triangular matrix
উচ্চ ত্ৰিকোণীয় মৌলকক্ষ
- (ii) Lower triangular matrix
নিম্ন ত্ৰিকোণীয় মৌলকক্ষ
- (iii) Diagonal matrix
কৰ্ণ মৌলকক্ষ
- (iv) None of the above
ওপৰৰ এটাও নহয়

(Choose the correct option)

(স্বত্ব উত্তৰটো বাছি উলিওৱা)

(b) What is the difference between direct methods and iterative methods for solving a system of Linear equations ?
 বৈকল্পিক সমীকৰণৰ গোট সমাধান কৰা প্ৰত্যক্ষ বিধি আৰু পুনৰাবৃত্তি বিধিৰ পাৰ্থক্য কি ?

(c) Define operator Δ and E .
 Δ আৰু E সংকাৰকৰ সংজ্ঞা দিয়া।

(d) Find $\Delta^{n+1}x^n = ?$
 $\Delta^{n+1}x^n$ ৰ মান উলিওৱা।

(e) The value of $\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1+x^2}$ is

$$\int_0^{\pi/4} \frac{dx}{1+x^2} \text{ ৰ মান}$$

(i) 0

(ii) 1

(iii) 2

(iv) None of the above

ওপৰৰ এটিও নহয়

(Choose the correct option)

(স্বত্ব উত্তৰটো বাচি উলিওৱা)

(f) Write down Newton's forward interpolation formula.

নিউটনৰ অগ্ৰগামী অন্তৰ্ৰেখন সূত্ৰটো লিখা।

(g) State the formula for Simpson's $\frac{3}{8}$ th rule.

চিম্পচনৰ $\frac{3}{8}$ তম নিয়মৰ সূত্ৰটো উল্লেখ কৰা।

(h) What do you mean by Numerical Differentiation ?

সংখ্যাগত অৱকলন বুলিলে কি বুজা ?

(i) Where is Euler's method used ?

ইউলৰ মেথড ক'ত ব্যৱহাৰ কৰা হয় ?

(j) What is the disadvantage of Taylor series method in differential equation.

অৱকলন সমীকৰণৰ ক্ষেত্ৰত টেইলৰ শ্ৰেণী পদ্ধতিৰ অসুবিধা কি ?

2. Answer the following questions : 2×5=10

তলত দিয়া প্ৰশ্নবোৰৰ উত্তৰ কৰা :

(a) Prove that $E = I + \Delta$, where I is the identity operator.

প্ৰমাণ কৰা যে $E = I + \Delta$ য'ত I এটা একক অপাৰেটৰ।

(b) Show that the third divided difference

of the function $f(x) = \frac{1}{x}$ with

arguments a, b, c, d is $-\frac{1}{abcd}$.

যদি $f(x) = \frac{1}{x}$ হয়, বাণিসূচক a, b, c, d ৰ কাৰণে

তৃতীয় বিভাজিত অন্তৰৰ মান $-\frac{1}{abcd}$ হয় বুলি

দেখুৱা।

(c) Express $f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 3x - 10$ into factorial notation.

$f(x) = 2x^3 - 3x^2 + 3x - 10$ বাণিটো ক্ৰমগণিত সংকেত চিনত প্ৰকাশ কৰা।

(d) What are the advantages of Lagranges interpolation formula?

লাগ্ৰাঞ্জৰ অন্তৰ্বেশন সূত্ৰটোৰ সুবিধাবোৰ কি কি?

(e) What is extrapolation? Name an extrapolation method.

Extrapolation মানে কি? এটা extrapolation বিধিৰ নাম লিখ।

3. Answer **any four** questions from the following : 5×4=20

তলৰ যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা :

(a) Solve the following system of equation by Gauss elimination method :

Gauss elimination পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি সমাধান কৰা :

$$2x - y + 3z = 9$$

$$x + y + z = 6$$

$$x - y + z = 2$$

(b) Prove that (প্ৰমাণ কৰা যে)

$$e^x = \left(\frac{\Delta^2}{E} \right) e^x \frac{E e^x}{\Delta^2 e^x}$$

where 'h' is the interval of differencing.

য'ত 'h' বাণিজ্য অন্তৰাল হয়।

(c) Find the polynomial $f(x)$ by using Lagrange's formula and hence find $f(3)$ for :

লগাঞ্জৰ অন্তৰ্বেশন সূত্ৰটো ব্যৱহাৰ কৰি বহুপদ

$f(x)$ ৰ মান উলিওৱা আৰু $f(3)$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা :

x	0	1	2	5
$f(x)$	2	3	12	147

(d) Estimate the missing figure of the following table :

তলত দিয়া তালিকাখনৰ খালী ঠাই পূৰ কৰা :

x	1	2	3	4	5
$f(x)$	2	5	7	—	32

(e) Find $y'(x)$ from the following table given below and hence find $y'(0)$.

তলৰ টেবুলখনৰ x আৰু y ৰ মান ব্যৱহাৰ কৰি $y'(x)$

আৰু $y'(0)$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

x	0	1	2	3	4
y	4	8	15	7	6

(f) Use Trapezoidal Rule to find the value

of $\int_0^6 \frac{dx}{1+x}$ by taking six ordinates.

হয়তাতো অন্তৰাল লৈ ট্ৰেপিজয়ডেল নিয়ম ব্যৱহাৰ কৰি

$\int_0^6 \frac{dx}{1+x}$ ৰ মান নিৰ্ণয় কৰা।

4. Answer **any four** questions from the following : $10 \times 4 = 40$

তলৰ যিকোনো চাৰিটা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰা :

(a) Solve the system of equation correct to 3 decimal places using Jacobi's iteration method :

জেকবী পুনৰাবৃত্তি পদ্ধতি ব্যৱহাৰ কৰি তলৰ ত্ৰৈবিক সমীকৰণ গোটৰ সমাধান 3 দশমিক স্থানলৈ শুদ্ধকৈ উলিওৱা :

$$\begin{aligned} x + 17y - 2z &= 48 \\ 30x - 2y + 3z &= 75 \\ 2x + 2y + 18z &= 30 \end{aligned}$$